

# モビプレップ® 配合内用剤 を服用される方へ

モビプレップ® 配合内用剤は、大腸内視鏡検査、大腸手術を行う前に、腸管の内容物を排除し腸管内をきれいにするためのお薬です。

## 服用の前に

※使用直前まで、アルミの袋は開封しないでください。

## 飲食に関する注意

### ■ 大腸内視鏡検査前処置の場合


検査当日の朝は絶食してください。検査終了まで、食事はできません。水、お茶は飲むことができます。

### ■ 大腸手術前処置の場合

手術前日の昼食後は絶食してください。水、お茶は飲むことができます。

## 溶解のしかた

- 1 アルミの袋を開封し、バッグのキャップを開けて★の目印まで水を入れてください。
- 2 キャップをしっかりと閉めて、A剤とB剤の隔壁を開通させます。
- 3 バッグをよく振り粉末を溶解してください。
- 4 平らな場所におき、2リットルの目盛り線までさらに水を入れ、キャップを閉め、よく振り混ぜて完全に溶解してください。



## 注意事項

- お茶やジュース、スポーツドリンクなどで溶かさないでください。
- 砂糖や香料などを加えないでください。

## 連絡先


# 服用のしかた

- 1 モビブレップ。をコップに移し、コップ1杯(約180ミリリットル)あたり、10~15分かけて排泄液が透明になるまでゆっくり服用します。  
※飲み始めのコップ2~3杯目まではゆっくりと(15分で1杯)服用してください。  
※高齢の方は、最後までゆっくりと(15分で1杯)服用してください。
- 2 モビブレップ。約1リットル服用ごとに、水またはお茶をコップ3杯程度(約500ミリリットル)を同様にゆっくりと飲みます。
- 3 1リットル服用途中で、排泄液が透明になったら服用を終了し、モビブレップ。の服用量の半量の水またはお茶を必ず飲んでください。

## ●服用例…モビブレップ。1.5リットル服用した時点で、排泄液が透明になった場合

☐ …1杯(180ml) / 10~15分かけて服用

便がほぼ透明な水様便になった。



モビブレップ。の服用量の半分の水またはお茶を必ず飲んでください。

服薬は、便がほぼ透明な水様便になった場合、またはモビブレップ。2リットルと水1リットルを服用した時点で終了です。

※2リットル服用しても排便が無い場合は、医師・看護師・薬剤師等に連絡してください。

## 注意事項

- モビブレップ。の服用前後または服用中にも、のどが渴いた場合にはがまんせずに「水またはお茶」を飲んでください。

飲んでもよい水分	水(ミネラルウォーターも可) お茶(煎茶、番茶、ウーロン茶、麦茶、紅茶(砂糖、ミルクは使用不可))など
飲んではいけない水分	スポーツ飲料水、乳製飲料(牛乳、飲むヨーグルト)、ジュース類、アルコール類、砂糖、固形物が入っている飲料、など

- 一人では服用しないでください。
- 服用前に便秘症状または下痢症状が続いている方は、事前に医師・看護師・薬剤師等に連絡してください。

次の症状があらわれた場合には、がまんせずに直ちに服用を中止し、医師、看護師、薬剤師等に連絡してください。服用後に症状があらわれた場合にも、同様にご連絡ください。

- ・ 気分が悪い
- ・ 顔が青ざめる
- ・ 息苦しい
- ・ 吐き気がする
- ・ めまいがする
- ・ じんましんが出る
- ・ 吐いた
- ・ 寒気がする
- ・ お腹が痛い
- ・ 顔がむくむ
- など