

表2 トリプタンの用法・用量・追加投与・禁忌

	スマトリプタン (イミグラン®)	ゾルミトリプタン (ゾーミック®)	エレトリプタン (レルパックス®)	リザトリプタン (マクスルト®)	ナラトリプタン (アマージ®)	
用法・用量	1回1錠 効果不十分の場合 1回2錠可 1日最大4錠まで	1回1錠 効果不十分の場合 1回2錠可 1日最大4錠まで	1回1錠 1回2錠不可 1日最大2錠まで	1回1錠 1回2錠不可 1日最大2錠まで	1回1錠 1回2錠不可 1日最大2錠まで	
追加投与	同じ成分は2時間以上 異なる成分は24時間以上				同じ成分は4時間以上 異なる成分は24時間以上	
効能・効果に関する 使用上の注意	家族性片麻痺性片頭痛、孤発性片麻痺性片頭痛、脳底型片頭痛あるいは眼筋麻痺性片頭痛の患者には投与しないこと					
禁 忌	過敏症	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者				
	心疾患	心筋梗塞の既往のある患者、虚血性心疾患またはその症状・兆候のある患者、異型狭心症(冠動脈痙攣)のある患者				
	脳血管障害	脳血管障害や一過性脳虚血発作の既往のある患者				
	末梢血管障害	末梢血管障害を有する患者				
	高血圧症	コントロールされていない高血圧症の患者				
	肝機能障害	重篤な肝機能障害 を有する患者	重度の肝機能障害を有する患者			重度の肝機能障害のある 患者
	片頭痛治療薬	エルゴタミン、エルゴタミン誘導体含有製剤、他の5-HT <sub>1B/1D</sub> 受容体作動薬				
	MAO阻害剤	モノアミンオキシターゼ阻害剤を投 与中、あるいは投与中止2週間以内の 患者			モノアミンオキシターゼ阻 害剤を投与中、あるいは投 与中止2週間以内の患者	
	腎機能障害			血液透析中の患者	重度の腎機能障害のある 患者	
その他			HIVプロテアーゼ 阻害薬を投与中の 患者	プロプラノロール塩酸塩を 投与中の患者		