

予防接種の接種間隔について

西宮市保健予防課 予防接種チーム
TEL : 0798-35-3308

※以下の予防接種を受ける際は、接種間隔を確認のうえ接種しましょう。

種類	備考	回数	接種間隔	
ロタウイルス（ロタリックス）		2回目	1回目から27日以上の間隔をあけて接種	
ロタウイルス（ロタテック）		2回目	1回目から27日以上の間隔をあけて接種	
		3回目	2回目から27日以上の間隔をあけて接種	
B型肝炎		2回目	1回目から27日以上の間隔をあけて接種	
		3回目	1回目から20週(139日)以上の間隔をあけて接種	
ヒブ	※1回目の接種開始日が生後7か月を過ぎる場合や、2回目及び3回目接種時に1歳を超える場合は、保健予防課にお問い合わせください。(接種回数が変わります)	2回目	1回目から27日以上(標準的には56日まで)の間隔をあけ、 <u>1歳未満</u> の間に接種	
		3回目	2回目から "	
		追加	初回接種終了後、7か月以上(標準的には13か月まで)の間隔をあけて接種	
小児用肺炎球菌	※1回目の接種開始日が生後7か月を過ぎる場合や、1歳になってから2回目を接種した場合、2回目及び3回目接種時に2歳を超える場合は、保健予防課にお問い合わせください。(接種回数が変わります)	2回目	1回目から27日以上(標準的には56日まで)の間隔をあけ、 <u>2歳未満</u> の間に接種	
		3回目	2回目から "	
		追加	初回接種終了後、60日以上の間隔をあけ、1歳に至った日以降に接種	
五種混合(DPT-IP-Hib) 四種混合(DPT-IPV)	※ 五種混合で接種を開始した場合、ヒブ及び四種混合の接種は不要。	2回目	1回目から20日以上(標準的には56日まで)の間隔をあけて接種	
		3回目	2回目から "	
		追加	初回接種終了後、6か月以上(標準的には12か月から18か月まで)の間隔をあけて接種	
水痘		2回目	1回目から3か月以上(標準的には6か月から12か月まで)の間隔をあけて接種	
日本脳炎		2回目	1回目から6日以上(標準的には28日まで)の間隔をあけて接種	
		追加	2回目から6か月以上(標準的には1年)の間隔をあけて接種	
子宮頸がん (2価、サーバリックス)	※標準的には、1か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種	2回目	1回目から1か月以上の間隔をあけて接種	
		3回目	1回目から5か月以上かつ、2回目から2か月半以上の間隔をあけて接種	
子宮頸がん (4価、ガーダシル)	※標準的には、2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種	2回目	1回目から1か月以上の間隔をあけて接種	
		3回目	2回目から3か月以上の間隔をあけて接種	
子宮頸がん (9価、シルガード)	①2回接種対象者：小学6年生～15歳未満（誕生日の前日まで）の間に、9価ワクチンの1回目を接種した女性 ※ただし、1回目から1か月以上5か月未満で2回目を接種した場合は、合計3回接種（②）となる。	2回目	1回目から5か月以上の間隔をあけて接種 ※標準的には1回目から6か月以上の間隔をあけて接種	
	②3回接種対象者：15歳以上で9価ワクチンの1回目を接種した女性	2回目	1回目から1か月以上の間隔をあけて接種	※標準的には1回目から2か月の間隔をあけて接種
		3回目	2回目から3か月以上の間隔をあけて接種	※標準的には1回目から6か月の間隔をあけて接種